

MULTI

Concime organo-minerale potassico pre-stress con sostanza organica vegetale nobile inodore, ricca di acidi umici e fulvici a potente azione radicante, con magnesio e ferro.

**Nutre e fortifica il prato e le piante per oltre 60 giorni
NPK 12-5-17 +2 Mg**

BENEFICI

- Sostanza organica vegetale inodore ad elevato tasso di umificazione ricca di amminoacidi levogiri con potassio da solfato
- Naturale lenta cessione garantita dall'azione complessante e veicolante di acidi umici e fulvici che regolano il degradamento dei macroelementi e stimolano una forte radicazione
- Potente preventivo potassico contro gli stress estivi ed invernali. Fortifica le pareti cellulari e prepara il prato alle alte e basse temperature
- Aumenta e rigenera la flora batterica aumentando la fertilità del suolo e prevenendo e riparando i danni da usura e calpestamento.
- Consigliato per i prati su fondi sabbiosi (es. vivai di prato a zolle, fairways, tee e campi sportivi, naturali e ibridi) con bassa attività microbica
- Ideale concime di mantenimento per piante ornamentali, alberi, cespugli, orti e aiuole fiorite. Ottimo nei frutteti e vigneti domestici

ASPETTI TECNICI

12% Azoto (N): 1,5% organico (vegetale)
3,2% Nitrico, 5,7% ammoniacale, 1,6% ureico
5% Anidride fosforica (P₂O₅)
17% Ossido di potassio solubile (K₂O)
2% Ossido di Magnesio
4% Acidi umici e fulvici
15% Anidride solforica (SO₃)
15% Sostanza organica vegetale

Granulometria: 2,5 mm

Fortificante potassico raccomandato per prevenire gli stress ambientali in estate ed in autunno. Aumenta la resilienza del prato, accelera la cicatrizzazione delle ferite da taglio e riduce le abrasioni alle punte e stimola la radicazione. E' costituito da granuli inodori, omogenei, compatti, di facile distribuzione e dissoluzione. Contiene una matrice vegetale umificata che fornisce l'habitat perfetto per i microorganismi; è inoltre ricco di acidi umici e fulvici e di amminoacidi vegetali.

DOSAGGIO RACCOMANDATO

Manutenzione regolare su prati maturi:

35-40 kg / 1000 m² in tutti i periodi dell'anno, specialmente in ottobre-novembre e in giugno-luglio. Bagnare per 10 minuti dopo la distribuzione

Concimazione di alberi e cespugli:

35-40 gr / m² in marzo-aprile. Incorporate nei primi 5 cm di terreno. Dose varia in funzione della dimensione della pianta

PACKAGING: Sacchi da 25 kg su pallet da 1500 kg

